

Ingegneria dell'energia, A.A. 2018/19
ALGEBRA LINEARE F. Acquistapace, V.M. Tortorelli
Sesto foglio di esercizi

NOTAZIONE: se $M(t)$ è una matrice di funzioni $m_i^j(t)$ derivabili si ha:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{M(t+h) - M(t)}{h} = ((m_i^j(t))')_{i,j} =_{\text{def}} M'(t).$$

Esercizio 1 (Regola di Leibniz per la derivata del determinante di una matrice di funzioni)

a- Si calcoli la derivata rispetto a t di: $\det \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$, $\det \begin{pmatrix} t & 1 & 0 \\ t^2 & 2t & 2 \\ t^3 & 3t^2 & 6t \end{pmatrix}$.

b- Sia $M(t) = (M^1(t) | \dots | M^n(t))$, una matrice $n \times n$ di funzioni $m_i^j(t)$ derivabili in $t \in \mathbf{R}$, con colonne nell'ordine M^1, \dots, M^n . Indicando con M_{ij}^j la matrice $(n-1) \times (n-1)$ ottenuta da M togliendo la i^a riga e la j^a colonna, provare che

$$\begin{aligned} (\det M)' &= \\ &= \sum_{j=1}^n \det(\dots M^{j-1} | (M^j)' | M^{j+1} \dots) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (m_i^j)' (-1)^{i+j} \det M_{ij}^j \\ &=_{\text{def}} \text{tr} [M' \text{adj} M] = \langle M' \cdot {}^t(\text{adj} M) \rangle_{\mathbf{R}^{n^2}} =_{\text{def}} \langle M' \cdot \text{cof} M \rangle_{\mathbf{R}^{n^2}} \end{aligned}$$

NOTA: il determinante di una matrice $n \times n$ può essere considerato come un "prodotto in blocco" delle n colonne (righe), essendo lineare per colonne (righe): se le colonne di M si indicano con M^1, \dots, M^n , scrivendo in modo suggestivo $\det M = M^1 \dots M^n$ si avrebbe quindi come per il prodotto di funzioni

$$(M^1 \cdot \dots \cdot M^n)' = \sum_{i=1}^n \dots M^{i-1} \cdot (M^i)' \cdot M^{i+1} \dots$$

c- Se $M(0) = I_{n \times n}$ provare che

$$\det M(t) = 1 + t \cdot \text{tr} M'(0) + o(t).$$

Che dire, per $M(t)$ generica matrice di funzioni derivabili in t , dello sviluppo di Taylor di $\det M(t)$ di ordine 1 e centrato in $t = 0$?

d- Se, data un'altra $A(t)$ matrice $n \times n$ di funzioni (continue), si ha $M'(t) = A(t)M(t)$, provare che

$$(\det M(t))' = \text{tr} A(t) \cdot \det M(t), \quad \text{per cui} \quad \det M(t) = d \cdot e^{\int [\text{tr} A(\tau)] d\tau}.$$

Esercizio 2 Siano $M(t)$, $n \times k$, ed $N(t)$, $k \times m$, due matrici di funzioni derivabili.

a- Provare che $(M(t)N(t))' = M'(t)N(t) + M(t)N'(t)$.

b- Se $k = n$ e le $M(t)$ sono invertibili allora $M^{-1}(t)$ è derivabile e $(M^{-1}(t))' = -M^{-1}(t)M'(t)M^{-1}(t)$.

c- Trovare un esempio in cui $(M^{-1}(t))' \neq -M^{-2}(t)M'(t)$, $-M'(t)M^{-2}(t)$.

Esercizio 3 a - Si $M(t)$ una matrice ortogonale di funzioni derivabili. Provare che ${}^t M M'$ è antisimmetrica.

b - Si considerino i moti $p(t)$, di egual rotazione uniforme attorno ad un asse *fisso*, per l'origine, individuato dal versore v , $\|v\| = 1$, dati da $p(t) = M(t)u$, ove: le u sono le posizioni iniziali e $M(t)$ una matrice, di funzioni derivabili, per cui $M(0) = Id$. Provare che:

- ${}^t M M = Id$, $\det M = 1$,

- in generale la matrice associata all'applicazione lineare $L(x, y, z) = (a, b, c) \times (x, y, z)$ è

$$\begin{pmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{pmatrix},$$

- detto Ω il vettore (costante) di velocità angolare, velocità = $p'(t) = M'u = \Omega \times Mu = \Omega \times p(t)$, si ha

$$M'(t)^t M(t) = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_3 & \Omega_2 \\ \Omega_3 & 0 & -\Omega_1 \\ -\Omega_2 & \Omega_1 & 0 \end{pmatrix},$$

- ${}^t M$ ed M' commutano.

Esercizio 4 Data $B \in \mathcal{M}(n, n)$ si consideri l'endomorfismo $L : \mathcal{M}(n, n) \rightarrow \mathcal{M}(n, n)$ dato da

$$L(A) = BA.$$

a- Se $n = 2$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, si calcolino gli autovalori di L , le dimensioni dei rispettivi autospazi, e si discuta la diagonalizzabilità di L .

b- In generale si provi che B ed L hanno gli stessi autovalori.

c- Si esprima il polinomio caratteristico di L in termini di quello di B ,

[può convenire identificare $\mathcal{M}(n, n)$ con \mathbf{R}^{n^2} , e quindi L con una matrice $n^2 \times n^2$].

- Trovare la relazione tra la molteplicità algebrica di un autovalore relativa a B con quella relativa ad L .

Si provi che se B è diagonalizzabile anche L lo è.

d- Si provi che un polinomio annulla B se e solo se annulla L . Se ne deduca che se L è diagonalizzabile anche B lo è.

f- Si provi che ogni autovalore ha molteplicità geometrica rispetto ad L eguale ad n volte quella rispetto a B

[può esser utile considerare un elemento di $\text{Ker}(\mu Id_{\mathcal{M}} - L)$ come funzione lineare da $\mathbf{R}^n \rightarrow \text{Ker}(\mu Id_{\mathbf{R}^n} - B)$].